



INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL — MISSÃO A CABO VERDE (1948-49)

TINHAS HUMANAS EM CABO VERDE

II — ESTUDO ETIOLÓGICO DE ALGUNS CASOS DA ILHA DE SANTO ANTÃO

MANUEL T. V. DE MEIRA, J. F. PINTO NOGUEIRA
e A. MATOS COITO

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
E DE MEDICINA TROPICAL
DE LISBOA
BIBLIOTECA

TINHAS HUMANAS EM CABO VERDE

II — ESTUDO ETIOLÓGICO DE ALGUNS CASOS DA ILHA DE SANTO ANTÃO

MANUEL T. V. DE MEIRA, J. F. PINTO NOGUEIRA
e A. MATOS COITO

Quando visitámos em missão de estudo a ilha de Santo Antão, em 1948, foi-nos dado observar alguns casos de tinha tonsurante entre a população infantil da ilha.

Foi então colhido o material de interesse para o seu estudo etiológico, o qual veio a fazer-se nos primeiros meses de 1949, após o nosso regresso a Lisboa.

Embora o número de casos seja muito limitado, achámos de utilidade dar publicação a este nosso trabalho, dado o crescente interesse que a caracterização etiológica das tinhas vem merecendo, por toda a parte, e sabendo nós que em Cabo Verde ela foi apenas iniciada (1).

★

Durante a nossa permanência, de cerca de três meses, na ilha, reunimos material (pêlos e escamas) de 17 crianças, portadoras de lesões características, ou apenas suspeitas, de tinha do couro cabeludo.

Estas crianças eram residentes em várias localidades da ilha, a saber:

Vila da Ponta do Sol — 5

Vila da Ribeira Grande — 5

Vila de Santo António das Pombas (Paul) — 3
Chã de Igreja — 1
Tarrafal — 1
Porto Novo — 2.

As idades destas crianças variavam entre 3 e 13 anos.

Os exames directos dos pêlos e escamas resultaram positivos em 12 casos.

O exame cultural foi possível fazer-se em 10 casos, dos quais 9 devidos a *Microsporum felineum* e 1 a *Trichophyton ferrugineum* ⁽¹⁾.

Apenas 3 casos foram simultâneamente negativos aos exames directo e cultural.

Ambas as espécies encontradas nesta ilha o haviam sido já em S. Nicolau e Boa Vista, por M. Meira, J. Pinto Nogueira e Tito S. Simões (1), em 1946-47.

RESUMO

Em 1948, os AA. visitaram a ilha de Santo Antão, arquipélago de Cabo Verde, tendo observado 17 casos de tinha tonsurante, 9 dos quais devidos a *Microsporum felineum* e 1 a *Trichophyton ferrugineum*. Dos restantes casos não obtiveram culturas.

RÉSUMÉ

Les auteurs ont observé dans l'île de Santo Antão (archipel du Cap. Vert) 17 cas de teigne du cuir chevelu, dont 9 dûs au *M. felineum* et 1 au *T. ferrugineum*.

SUMMARY

In 1948 the authors visited the island of Santo Antão (Cape Verde islands) having seen 17 cases of *tinea capitis*, 9 of which were due to *M. felineum* and 1 to *T. ferrugineum*.

BIBLIOGRAFIA

- 1) MEIRA, MANUEL T. V. DE, NOGUEIRA, J. PINTO, e SIMÕES, T. SERRAS — An. Inst. Med. Trop., 15: 4, 867, 1959.

⁽¹⁾ Exames efectuados na cadeira de Dermatologia e Micologia do I. M. T.

